

冬季气温较低，传染病多发，应加强饲养管理。

1. 防寒保暖。冬季气候寒冷多变，乌鸡产蛋的适宜温度为 20°C 左右，低温不能低于 13°C 。如果舍内温度达不到要求，温差过大，则要人工加热增温，并尽量保持温度相对稳定。放养乌鸡应采取迟放早收的方式，即早上9点至10点放，太阳落山前将鸡群关进鸡舍。

2. 适度通风。冬季由于气温较低，鸡舍门窗关闭严实，导致鸡舍内空气质量下降，易诱发鸡群呼吸道等疾病。因此，要及时清除鸡舍内的粪便和杂物，在中午天气较好时，开窗通风，使鸡舍内空气清新、清洁干燥。及时维修损坏的水槽，加水时切忌过多过满，严禁向舍内地面泼水等。

3. 定期消毒。消毒工作应贯穿养鸡全过程。可选用高效

低毒、刺激性小的消毒剂，但喷雾时要避开鸡体，以免受凉。同时，要做好空栏期的卫生消毒工作。

4. 做好疫病防治工作。冬季鸡群抵抗力下降，要注意做好防疫工作，按免疫程序进行预防接种。经常观察鸡群动态，对患病鸡做到早发现、早隔离、早诊断、早治疗，一旦怀疑发生传染病时，应立即向当地兽医站报告，以免贻误时机，造成疫情扩散和蔓延。

冯汉民

摘编自《农业科技报》

冬季乌鸡养殖管理要点



邹鹏/图

躯两侧羽毛上擦拭黏液。严重时病鹅呼吸困难，呼吸时发出鼾声，脚部麻痹，不能站立行走，严重时出现腹泻或死亡，病程2~5天。

2. 防治方法。(1)保持鹅舍卫生。舍内要定期打扫，鹅舍及用具要定期消毒。(2)预防接种。取巧克力琼脂培养基24小时培养物，制成生理盐水悬浮液，加热至 60°C 灭活30分钟，制成菌苗，经过灭菌和安全检验后，每只鹅颈部皮下注射0.5毫升，

间隔5天再注射1次，具有一定的预防效果。(3)药剂治疗。可用10%磺胺六甲氧嘧啶，按照鹅每千克体重用0.5克进行拌料，每天2次，连用3天。或用20%氟苯尼考每克兑水5千克，每天2次，连用3天。对个别病重鹅可用氟苯尼考针剂，按照每千克体重用0.5毫克进行肌肉注射。

蒋凡

摘编自《安徽科技报》